



노랑뿔기나방 / *Monema flavescens* Walker, 1885

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	뿔기나방과

과명	Limacodidae
일반특징	<p>더듬이는 실 모양이고 약간 납작하며, 황갈색을 띤다. 아랫입술수염도 황갈색이고, 길게 뻗어서 정수리를 지난다. 얼굴은 갈색이며, 정수리는 노란색이다.</p> <p>다리는 갈색을 띠는데 뒷다리의 종아리마디에는 2쌍의 며느리발톱이 있다. 앞날개는 옅은 노란색 바탕에 가로선 두 개가 날개 끝에서 비스듬히 나 있으며, 암갈색을 띤다. 뒷날개는 앞날개에 비해 색이 연하고, 가장자리 선은 암색이다. 날개의 길이는 28~35mm이다.</p> <p>애벌레의 몸길이는 약 24mm이며, 머리는 담갈색이고, 몸에 어두운 보라색 무늬가 있다. 중앙과 옆은 녹색이며 몸 표면에 가시털이 있다. 1년에 한 번, 6~8월에 나타난다. 어린 애벌레는 잎 뒷면에서 잎살만 먹지만 조금 더 자라면 가장 굵은 잎맥을 제외하고 전부 먹는다. 애벌레는 겨울을 나고 5월에 번데기가 되었다가 6월에 성충이 된다. 애벌레는 6~7월에 감아먹은 잎 뒷가지에 새알처럼 생긴 고치를 만들고 그 속에서 겨울을 난다. 고치는 타원형이고 회백색 바탕에 흑갈색 무늬가 있다.</p> <p>성충은 밤에만 활동하고, 빛을 향해 모이는 성질은 수컷이 강하고 암컷은 약하다. 성충은 밤에 교미한 후 잎에 1~2개씩 알을 낳는다.</p>