



: 2026 2 6 3:49



2012년도 식물·관총  
표본정보 DB구축 사업

Form 5 (revised December, 2006)

HERBARIUM OF CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY (CBU) 22910 CBU	
No. : 신안군(대죽산도)-111022-111	
Family Name : Elaeagnaceae	
Scientific Name : <i>Elaeagnus maritima</i> Koidz.	
Common Name : 녹보리똥나무	
Locality : 전남 신안군 흑산면 세리 촉선기 상대-세리	
GPS : 국가생물자원정보를 위해 상세좌표값은 차단되었습니다.	
Alt. : 27m	
Date : 2011.10.22	
Note :	
Collector : B.U.Oh et al.	FLORA OF KOREA 
Determinator : B.U.Oh	
Voucher of Flora, for Central & South Province	

충북대학교 식물표본실(CBU)

녹보리똥나무 / *Elaeagnus maritima* Koidz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	보리수나무속
과국명	보리수나무과
과명	Elaeagnaceae
일반특징	<p>요약설명 : 보리수나무과 상록 만경목으로 제주도와 전라남도, 대흑산도 및 완도에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도와 전라 남도에 분포, 대흑산도 및 완도에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록 만경목</p> <p>크기 : 높이 30~80cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 10월, 9월</p> <p>잎은 어긋나고, 타원 모양 또는 긴 타원모양이며 아랫부분은 뾰족하고 점첨두이다. 곁면은 초록색이고 뒷면은 갈색 비늘털로 덮여 있으며 가장자리에 물결 모양의 톱니가 있다. 잎자루에는 갈색 털이 있다.</p> <p>꽃은 9-10월에 은백색으로 핀다. 잎이 나온 자리에 짧은 가지가 생기고, 그 가지의 밑부분에 꽃이 몇 송이씩 달린다. 꽃자루에는 갈색 비늘털이 있다.</p> <p>꽃받침통은 종모양이다. 꽃받침열편은 갈색 점이 퍼져 있다. 암술대는 털이 없다.</p> <p>열매는 핵과고 타원 모양이다. 별모양의 하얀 털이 있으며 5~6월에 붉은색으로 익으면 먹을 수 있다.</p> <p>줄기는 다른 물체에 의존하여 기어오르면서 자라며, 어린 가지에는 갈색 비늘털이 촘촘히 모여 있다.</p> <p>섬 바닷가의 산기슭에서 자란다. 보리장나무에 비해 잎이 큰 편이다.</p>