

: 2025 11 7 11:36



누운괴불이끼 / Crepidomanes radicans (Sw.) K.lwats.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	누운괴불이끼속
과국명	처녀이끼과

과명	Hymenophyllaceae
일반특징	요약설명: 처녀이끼과 상록초본으로 제주도 남쪽 계곡에서 자란다. 분포지역: 제주도 남쪽 계곡에서 자란다. 형태: 상록초본 크기: 높이 1m 내외이다. 꽃색: 자주색 개화기: 7월,8월 잎은 드문드문 나오고 잎자루에는 큰잎자루와 더불어 좁은 날개가 있다. 잎몸은 잎자루보다 길고 달걀 같은 창 모양이며 2~3회 깃털 모양으로 갈라진다. 또한 노란빛이 도는 초록색이지만 마르면 흑갈색으로 변한다. 깃털조각은 어긋나며 달걀모양 또는 긴 달걀모양이고 잔깃조각도 어긋난다. 갈라진 잎 조각은 선 같은 긴 타원모양으로서 끝이 뭉뚝하며 가장자리가 밋밋하다. 홀씨주머니 무리는 낱잎 끝에 달린다. 홀씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 원통모양이며 끝이 약간 퍼지고 밑부분이 잎 속으로 들어가기 때문에 날개처럼 보인다. 줄기는 갈색빛이 도는 초록색이다. 뿌리줄기는 가늘고 옆으로 뻗으며 흑갈색 간털로 덮여 있다.
	계곡의 그늘지고 습한 바위의 겉면이나 큰키나무의 밑동에 붙어 자란다.