

 어린이 생물도감

: 2026 6 21 1:12



HERBARIUM	
Dept. of Botany, Seoul National University	
Family, <i>Salicaceae</i> <i>버들과</i>	No. 07827
Sci. Name <i>Salix pseudo-laciniifera</i> Levl.	
Kor. Name <i>눈꽃버들</i>	
Locality <i>충북 단양군, 영서리</i>	✓
Date <i>95, 11.20</i>	Coll. <i>이정호</i>
Habit.	Det. <i>3070072</i>

눈꽃버들 / *Salix graciliglans* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 전국 각지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목.</p> <p>크기 : 높이가 1m정도 된다.</p> <p>꽃색 : 검정색</p> <p>개화기 : 3월,4월</p> <p>잎은 좁은 창 모양으로 침두이고 밑부분이 뾰족하다. 겉면에는 털이 없고 뒷면은 처음에 부드러운 털이 있으나 점차 없어지며 가장자리에 작은 톱니가 있다. 잎자루에는 털이 있을 때도 없을 때도 있다.</p> <p>꽃은 3~4월에 잎보다 먼저 잎이 달리는 자리에 핀다. 또한 암꽃과 수꽃은 각각 다른 그루에 달린다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 긴 타원 모양 또는 달걀 같은 긴 타원모양이며 예두 또는 둔두이다. 또한 윗부분이 검은색이며 털이 있다.</p> <p>수술은 2개, 꿀샘은 1개이며 수술대는 완전히 붙어 있다. 암꽃 꽃차례는 꽃대축에 털이 있다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 달걀모양 침두로서 윗부분이 검은색이며 털이 있다. 씨방은 달걀모양이고 털이 나 있다. 암술대는 길고 암술머리는 4개, 꿀샘은 1개이다.</p> <p>열매는 삭과고 길고 부드러운 털이 있으며 4~5월에 익는다.</p> <p>원줄기는 가지가 많이 갈라지고 땅 가까이에 누워 자란다. 어린 가지에는 부드러운 털이 있으나 점점 없어지고 노란빛을 띠는 초록색으로 변한다..</p> <p>들이나 냇가에서 흔히 자라며, 꺾꽂이로 번식시킨다.</p>