



: 2026 2 5 11:05



각시족도리풀 / *Asarum glabrata* (C.S.Yook & J.G.Kim) B.U.Oh

구분	설명
생물분류	식물
속국명	족도리풀속
과국명	쥐방울덩굴과
과명	<i>Aristolochiaceae</i>
일반특징	<p>요약설명 : 쥐방울덩굴과 다년초로 우리나라 제주도, 전남 완도 등 남부 섬 해안에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국(제주도, 전남 완도 등 남부 섬 해안)</p> <p>형태 : 다년초</p> <p>크기 : 23~30cm</p> <p>꽃색 : 갈색, 녹색, 백색, 자주색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 심장형이며 녹색이다. 잎 끝이 둔한 모양이고, 표면과 표면 맥에 털이 많다. 잎 뒷면과 잎자루에는 털이 없다. 잎자루의 윗부분은 약간 흰색이며, 아래부분은 갈색 계열의 보라색 또는 흰색을 띤 보라색이다.</p> <p>꽃은 갈색을 띤 자주색이며 꽃자루는 흰색을 띤 보라색이다. 꽃받침은 갈색 계열의 보라색이며, 밑부분은 녹색을 띤 흰색 또는 흰색이다. 수술은 12개이다.</p> <p>씨앗은 털이 없고 깊고 깊은 회색을 띤 갈색이다.</p> <p>뿌리줄기는 마디와 마디 사이가 짧다. 중간마디로부터 사방으로 뻗은 뿌리는 특히 뿌리줄기 밑부분에 많이 난다.</p>