



대추나무 / *Zizyphus jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehder

구분	설명
생물분류	식물
속국명	대추나무속
과국명	갈매나무과

과명	Rhamnaceae
일반특징	<p>요약설명 : 갈매나무과 낙엽 활엽 관목으로 평안북도와 함경북도를 제외한 우리나라 전 지역에서 심어 재배할 수 있다. 중국에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국; 평안북도, 함경북도를 제외한 전국적으로 식재.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 8m.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월,5월</p> <p>잎은 어긋나고, 달걀 모양이며 윤기가 있다. 예두 또는 둔두며 원저이다. 가장자리에 뾰족한 톱니가 있고, 아랫부분에서 3개의 큰 맥이 발달하였다. 턱잎은 가시로 변한다. 잎이 늦게 나오기 때문에 양반나무라고 부르기도 한다.</p> <p>꽃은 한 꽃봉오리 안에 암술과 수술을 모두 갖고 있다. 꽃잎은 다섯 장이다. 5월 말~7월 중순에 연한 초록색으로 핀다. 취산꽃차례는 잎 달린 자리에 나며 꽃이 2~3개씩 달린다.</p> <p>열매는 핵과고 타원 모양이다. 9~10월이 되면 붉은 빛이 도는 갈색 또는 어두운 갈색으로 익는다. 대추는 다른 과실나무에 비하여 풍년과 흉년의 차이가 심하다. 꽃이 피는 때의 기상 조건, 즉 비가 내리는 양이나 기온, 햇볕이 드는 정도 등에 의해 결정된다. 그러나 다행히 최근에 보급되어 재배하는 대추나무는 불리한 기상조건에서도 열매가 잘 맺히는 좋은 품종이므로 비교적 안정적인 대추 생산이 가능하다.</p> <p>나무껍질은 회갈색이고 가지 끝에 털이 조금 있다. 어린 가지는 한군데에서 여러 개가 나오고 겨울을 나면서 말라 죽기 때문에 일부가 떨어진다.</p> <p>해발 800m 이하에 있는 마을 근처의 물이 잘 빠지고 땅의 깊이가 깊으며 자갈이 약간 섞인 곳이 좋다. 유기질이 풍부하고 모래가 많은 흙, 절반 정도 진흙이 섞인 흙에서 자란 나무가 품질이 우수하다. 추위와 건조함에 잘 견디며 대기오염에도 강하다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기, 꺾꽂이, 접붙이기 등의 방법으로 번식시킨다. 대추나무는 갈매나무과 대추나무속에 속하는 큰 키의 과실나무로서 중국계 대추와 인도계 대추 등 전혀 다른 2종이 재배되고 있다.</p>