

: 2025 11 7 10:21



대흥란 / Cymbidium macrorrhizum Lindl.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	보춘화속
과국명	난초과

과명	Orchidaceae
일반특징	요약설명: 난초과 부생식물로 우리나라의 강원도 삼척시, 충청남도 홍성군, 전라북도 부안군, 전라남도 여수시, 영광군, 경상남도 남해군, 제주도에서 자란다. 일본에서도 볼 수 있다. 분포지역: 일본 / 한국(강원도 삼척시; 충청남도 홍성군; 전라북도 부안군; 전라남도 여수시, 영광군; 경상남도 남해군; 제주도) 형태: 부생식물 크기: 높이 10~30cm이다. 꽃색: 백색,자주색 개화기: 7월,8월 꽃은 7~8월에 홍자색이 섞인 하얀색으로 피고, 2~6개의 꽃이 드문드문 달린다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 얇은 막처럼 되어 있으며 끝이 뾰족하다. 꽃받침조각은 거꿀달걀모양이며 끝이 뾰족하다. 꽃잎은 긴 타원 모양으로 꽃받침보다 짧다. 입술처럼 생긴 꽃잎 전체는 쐐기모양으로 가볍게 뒤로 젖혀진다. 가운데 밑부분이 약간 잘록하고 2개의 모가 진 선이 도드라지게 있으며 끝은 작은 물결모양이다. 수술과 암술이 합쳐진 꽃술대는 작은 돌기가 촘촘히 나 있다. 꽃대는 뿌리줄기 끝에서 나서 곧게 서며 약간의 털이 있다. 아랫부분에는 얇은 막처럼 되어 있는 비늘잎이 드문드문 있는데, 그 비늘잎의 밑부분은 짧은 잎집으로 되어 있다. 하얀색의 두꺼운 뿌리줄기는 길게 뻗으며 가지가 갈라져 나오고 삼각형의 비늘 조각이 덮여 있다.