



덩굴닭의장풀 / *Streptolirion volubile* Edgew.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	덩굴닭의장풀속
과국명	닭의장풀과

과명	Commelinaceae
일반특징	<p>요약설명 : 닭의장풀과 1년생 덩굴식물로 제주도를 포함한 우리나라의 전국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주도를 포함한 전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 1년생 덩굴식물.</p> <p>크기 : 길이 2~3m정도 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 잎자루가 길다. 끝이 뾰족하고 밑부분은 깊은 심장저며 가장자리가 밋밋하다. 겉면에는 가끔 털이 나 있으며 가장자리에도 털이 있다. 잎자루의 밑부분은 잎집이 된다. 잎집은 끝이 칼로 잘라 놓은 듯한 모양이며 가장자리에 털이 있다.</p> <p>7~8월이 되면 하얀색 꽃이 피고, 가지 끝과 원줄기 끝에 2~3개씩 달린다. 꽃은 하루 피었다 시드는 1일화이다. 꽃받침은 긴 타원 모양이고 둔두며 1~3개의 맥이 있다. 수술대에는 꼬불꼬불한 털이 있다. 꽃잎은 선모양이고 뒤로 젖혀지며, 수술은 6개이다.</p> <p>열매는 삭과고 모가 진 선이 3개가 있다. 또한 열매는 부리가 있고 타원 모양이며 털이 없다. 씨앗은 2~6개씩 들어 있으며 겉에 작은 돌기가 있다.</p> <p>줄기는 털이 없고 2~3m로 자라며 물체에 감긴다.</p> <p>산기슭의 습지에서 자란다. 동아시아에 3종, 우리나라에는 1종이 분포한다.</p>