

_어린이 생물도감

: 2026 2 4 11:28



도깨비엉겅퀴 / *Cirsium schantarense* Trautv. & Mey.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	엉겅퀴속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 여려해살이풀로 전국의 깊은 산 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국의 심산지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 여려해살이풀</p> <p>크기 : 높이는 50-150cm</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 7월, 8월, 9월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때까지 남아 있거나 없어지며 밑부분의 잎보다 작다. 줄기잎은 어긋나고 밑부분의 것은 타원모양 또는 창처럼 생긴 타원모양이며 가시가 있다. 잎이 밑으로 이어지며 잎자루의 날개가 되거나 원줄기를 약간 감싸고 깃털 모양으로 깊게 갈라지기도 한다. 가운데 달린 잎은 긴 타원 모양이고 밑부분이 귀처럼 되어 원줄기를 둘러싼다. 또한 가장자리가 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 갈라진 조각은 뒤로 젖혀지고 윗부분의 잎은 점차 작아져서 달걀 같은 창 모양이 된다.</p> <p>꽃은 7~9월에 자주색으로 피며 머리모양꽃차례는 가지 끝과 원줄기 끝에 1개씩 아래로 처진다. 총포는 둥근 모양이다. 총포조각은 6줄로 배열되며 끝이 뾰족하고 뒷면에 끈적끈적한 물질이 있거나 없다. 꽃잎 전체는 자주색이다.</p> <p>열매는 수과고 긴 타원 모양이다. 털이 없으며 칙칙한 갈색이고, 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 갈색을 띤다.</p> <p>줄기의 높이는 50~150cm이고, 원줄기에는 흠이 파인 줄이 있으며 윗부분에는 거미줄 같은 털이 있다.</p> <p><u>깊은 산 속에서 자란다.</u></p>