




도깨비잎말이나방 / *Sparganothis pilleriana* (Denis et Schiffermuller, 1775)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	국내는 경기도, 전라남도, 강원도, 국외는 일본, 중국, 러시아, 유럽에 분포한다. 아랫입술수염은 아주 길고 앞쪽으로 튀어나와 있으며, 특히 암컷이 더 길다. 앞날개의 제 4경맥과 제 5경맥은 Y자 모양으로 같은 자루를 이룬다. 앞날개는 노란색 바탕에 황갈색 가로선이 있는데, 개체에 따라 색깔과 무늬 변화가 매우 크다. 뒷날개는 회갈색 또는 암갈색이다. 수컷의 생식기에 난 돌기는 작대기 모양이며 끝이 구부러져 있고, 옆돌기는 가늘고 작다. 딸린기관은 뿌리부분이 넓고 끝이 좁아지는 모양이지만 돌기는 없다. 주머니는 약하게 발달되었으며, 배 1/5 지점에 작고 뾰족한 돌기가 있다. 애벌레는 먹이가 되는 풀의 잎을 말거나 엮어서 갇아 먹는다. 애벌레의 형태로 겨울을 나며, 그 이후에는 이른 봄에 감나무의 새잎을 파먹거나, 콩을 먹는다고도 알려져 있다. 사과나무, 싸리류, 등나무류, 애기나리, 고사리 등의 잎을 먹는다. 보통 5~8월에 나타난다.