



돌동부 / *Vigna vexillata* var. *tsusimensis* Matsum.

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 동부속 |
| 과국명 | 콩과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Leguminosae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 콩과 덩굴성 여러해살이풀로 전라남도 진도와 제주도에서 자란다. 분포지역 : 전라 남도 진도, 제주도에 난다. 형태 : 덩굴성 여러해살이풀 크기 : 길이 3m 꽃색 : 자주색,붉은색 개화기 : 8월,9월 잎은 어긋나고 3개의 작은 잎으로 구성된다. 작은 잎의 크기는 거의 비슷하고 양면에 털이 있다. 정소엽은 좁은 달걀모양이고 끝이 뾰족하며 작은 잎자루가 있다. 턱잎은 넓은 창 모양이고 맥이 뚜렷하며 끝이 뾰족하다. 작은잎턱잎은 선모양이다. 꽃은 8~9월에 피고 빛깔이 연한 홍자색에서 홍갈색으로 변한다. 꽃자루가 짧고 꽃을 감싸는 작은 잎이 일찍 떨어진다. 이 꽃은 우상모양꽃차례의 끝에 2~4개가 달리는데, 꽃차례는 잎 달린 자리에 난다. 꽃받침은 짧은 갈색 털이 있고 반 이상 갈라진다. 갈라진 조각의 끝은 뾰족하고 용골꽃잎은 부리처럼 약간 꼬부라진다. 열매는 길이가 6~10cm이고 겉에는 퍼진 갈색 털이 촘촘히 나 있으며 씨앗이 10개 정도 들어 있다. 줄기는 길이가 3m에 달하고, 줄기와 잎자루에는 밑으로 향해 자라는 갈색의 퍼진 털이 있다. 뿌리는 크고 뚱뚱하며, 곧게 땅 속으로 들어간다. 돌동부는 야생 동부라는 뜻이며 돌팔이라고도 한다.</p> |