



: 2026 2 23 12:01



동백나무겨우살이 / *Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	동백나무겨우살이속
과국명	꼬리겨우살이과

과명	Loranthaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼬리겨우살이과 상록기생소관목으로 우리나라의 전라남도 목포 및 제주도, 남해 섬지방 등 해발 700m 이하의 난대림 지역에서 흔히 볼 수 있다. 일본과 중국, 대만, 말레이시아, 인도, 호주 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 일본과 중국, 대만, 말레이지아, 인도, 호주 등지에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록기생소관목</p> <p>크기 : 높이 5~30cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 제 기능을 하지 못해 비늘처럼 되었으며, 작고 마디의 위쪽 끝에 돌기처럼 달려 있다.</p> <p>암꽃과 수꽃이 한 그루에 달린다. 꽃은 4~5월에 핀다. 한 마디에 5~6개씩 달리고 꽃대는 없다. 꽃덮이는 3개로 갈라지며 꽃가루주머니는 꽃덮이 안에 달려 있고 구멍이 많다. 씨방은 꽃받침 아래에 있다.</p> <p>열매는 수분이 많은 장과고 넓은 타원 모양이다. 10~12월에 익으며 끝에 암술대가 달려 있다. 씨앗은 1개씩 들어 있고 열매 껌데기에서 튀어 나온다.</p> <p>줄기의 높이는 5~30cm이고 가지는 초록색이며 털이 없다. 관절이 많이 갈라지며 마디 사이가 평평하다. 거꿀피침모양의 마디가 많이 있고 가지가 마주나기한다.</p> <p>동백나무, 사스레피, 모새 및 사철나무에 붙어 기생하여 자란다. 여름에는 반그늘에서 자라고 겨울에는 햇빛을 많이 받는다. 지붕이 없는 보통 땅에서 겨울을 나고 16~30°C에서 잘 자란다. 여러 환경에 적응하는 능력은 보통이다.</p> <p>가을에 익은 열매를 상록활엽수의 오목한 나무껍질 부분에 문질러서 붙여 놓으면 싹이 트며 번식한다. 학술적 가치가 있고 형태적으로 측백나무나 편백나무처럼 가지와 잎의 배열이 같아서 흥미롭다. 광나무, 감탕나무, 동백나무, 사스레피나무, 은목서, 우묵사스레피나무, 꽝꽝나무 등의 가지에 기생한다.</p>