



돼지풀 / *Ambrosia artemisiifolia* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	돼지풀속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 한해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 유럽과 아시아 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶지리적으로 유럽과 아시아 등지에 분포▶전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 1m 내외이다.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>잎은 밑부분에서는 마주나기하며 윗부분에서는 어긋나기하고 2~3회 깃털 모양으로 갈라진다. 길이는 3~11cm로서 겉면이 진한 초록색이고 털이 있으며 뒷면은 잿빛이 돌고 부드러운 털이 뺏뺏하게 난다.</p> <p>꽃은 8~9월에 피고 원줄기와 가지 끝에 이삭 모양으로 달린다.</p> <p>머리모양꽃차례는 암꽃이나 수꽃 중 하나만 달려 있다. 암꽃 머리모양꽃차례는 1개 또는 여러 개가 모여서 수꽃 머리모양꽃차례로 이루어진 이삭꽃차례 밑에 달린다. 수꽃 머리모양꽃차례는 10~15개의 꽃으로 이루어진다. 총포는 초록색이며 거꾸로 세운 원뿔 모양이고, 총포조각은 서로 붙어 있다. 암꽃 머리모양꽃차례는 1개의 꽃과 2개의 총포조각으로 이루어져 있다. 또한 초록색의 거꿀달걀모양이며 암술대가 2개로 갈라진다.</p> <p>열매는 수과고 딱딱한 열매주머니에 싸여 있다.</p> <p>줄기에는 짧고 역센 털이 전체적으로 나 있으며 가지가 많이 갈라진다.</p> <p>높이는 1m 이상으로 자란다.</p> <p>산기슭이나 도시 주변의 빈 땅에서 흔하게 자란다. 돼지풀은 꽃가루병(알레르기성 비염)을 일으키는 원인이 되기도 하며 소가 먹지 않는다.</p>