



돼지풀아재비 / *Parthenium hysterophorus* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	돼지풀아재비속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 한해살이풀로 경상남도 충무시에서 3년 동안 연속으로 채집 되었으며 더욱 번져가고 있는 것을 확인하였다. 북미, 호주, 일본에 귀화하였다.</p> <p>분포지역 : ▶북미, 호주, 일본에 귀화하였다.▶경남 충무시에서 3년간 연속 채집, 더욱 번져가고 있음을 확인되었다.</p> <p>형태 : 한해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30~90cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 11월,9월,10월</p> <p>잎은 어긋나고 전체적인 테두리가 달걀 모양 또는 타원 모양이다. 2회 깃모양겹잎이다. 위쪽의 잎은 점차 작아진다.</p> <p>9~11월에 꽃이 피며 촘촘한 편평꽃차례를 이룬다. 머리모양꽃차례는 하얀색이다. 총포는 찢잔 모양이며 총포조각은 마름모 모양이다.</p> <p>머리모양꽃차례의 가운데에서 통 모양을 하고 있는 약 40개의 꽃은 수꽃이며, 가장자리에 있는 5개의 혀꽃은 암꽃이다.</p> <p>열매는 수과고 거꿀 달걀 모양이다. 납작하게 생겼으며 위쪽에 손가락 모양처럼 생긴 2개의 부속체가 있으며 검은색이다.</p> <p>줄기는 곧게 자라며 높이는 30~90cm이다. 윗부분에서 가지가 갈라지며 털이 있다.</p> <p>황무지나 밭둑에 자란다. 국내에서는 고려대학교 강병화 박사에 의하여 경남 충무시에서 3년간 연속 채집되어 더욱 번져가고 있음을 확인하였다. 잎의 모습이 '돼지풀'과 비슷하여 이름을 '돼지풀아재비'로 하였다.</p>