



되새 / Fringilla montifringilla

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	되새과
과명	Fringillidae
일반특징	겨울철에 돌아나는 깃은 암컷과 수컷 모두 머리 부분이 진한 검은색이고, 뒷목은 흰색이다. 윗등은 잿빛으로 끝이 검은색이고, 아랫등은 갈색을 띤 검은색이다. 허리 중앙은 흰색이고, 양 옆은 검은색이다. 어깨 깃은 여우털과 같은 갈색이며, 위꼬리덮깃의 중앙은 흰색이고 양 옆은 검은 갈색이다. 턱밑에서 가슴까지는 붉은 갈색이고, 배는 흰색이다. 배 옆과 아래꼬리덮깃은 옅은 갈색을 띤다. 봄철의 털갈이는 없지만, 깃 가장자리가 닳는다. 겨울철의 부리는 노란색으로 끝이 검은색이며, 여름에는 검은색이다. 다리는 다양한 갈색이다. 생태적 특징 : 논밭이나 낮은 언덕, 큰 나무가 자라는 숲 등에 찾아오며, 10마리에서 수 백 마리가 무리지어 생활한다. 나무 위나 땅 위에서 먹이를 찾는다. 둥지는 큰 나무의 가지 위에 마른풀과 줄기를 이용해서 밥그릇 모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 5월 중순에서 6월 초이다. 알은 청색부터 진한 갈색을 띤 올리브색에 이르기까지 여러 가지로 진한 자갈색의 얼룩점이 있으며, 6~7개 낳는다.