



갈대노랑들명나방 / *Sclerocona acutellus* (Eversmann, 1842)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	포충나방과

과명	Crambidae
일반특징	국내 이리, 국외에는 일본, 러시아, 유럽 등지에서 볼 수 있다. 머리는 누런 색이고, 앞이마는 원뿔모양처럼 돌출되어 있으며, 양쪽이 흰색이다. 더듬이는 열은 노란색으로 암컷의 것은 실 모양이다. 아랫입술수염은 비스듬히 위로 뻗어 있는 모양으로, 아랫부분이 흰색이고 나머지 부분은 황갈색이다. 수염의 제 3 마디는 안쪽으로 길게 뻗어 있다. 배와 가슴의 등면은 황갈색, 가슴의 배쪽면은 하얀색에 가깝다. 다리는 흰색과 갈색이 섞여 있다. 앞날개는 바탕색이 누렇게 갈색기가 있으며, 끝이 뾰족하다. 뒷날개는 노란빛을 띠는 하얀색이다. 날개의 길이는 28mm 내외이다. 포충나방 아과의 나방과 비슷한 모양이다. 성충은 주로 5~8월경에 나타나며, 애벌레는 갈대의 잎을 여러 장씩 엮어매어 해를 끼친다.