



두줄갈고리가지나방 / *Rhynchobapta cervinaria* (Moore, 1888)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과
과명	Geometridae
일반특징	국내는 전라북도, 국외는 일본, 중국, 인도에 분포한다. 수컷의 더듬이는 빗살 모양이며, 암컷의 것은 실 모양이다. 몸과 날개는 담갈색이다. 날개에는 전체적으로 암갈색 점이 고르게 퍼져 있다. 가로선은 다소 붉은 빛이 도는 갈색이다. 안쪽 가로선은 대부분의 경우 선명하지 않으며, 뒷날개에서는 거의 찾아볼 수 없다. 앞, 뒷날개의 가로선 바깥 부분은 옅은 색 테두리가 둘러져 있다. 가로맥에 있는 검은 점은 앞날개에서는 크고 뒷날개에서는 작다. 개체에 따라서는 뒷날개의 것이 없어진 것도 있다. 앞날개의 날개 끝에서부터 암갈색 줄이 비스듬하게 나와 있다. 가장자리는 다소 어두운 색이며, 부드러운 털 밑부분은 담황색이고, 말단은 흰색이다. 뒷면은 앞면보다 연한 색이고 앞날개 앞쪽 가장자리는 노란 기가 있으며, 가로맥에 있는 점이 앞면보다 다소 작다. 날개 길이는 31~34mm이다. 6~8월에 나타난다.