

: 2025 12 14 1:35

---



두줄점가지나방 / *Chiasmia defixaria* (Walker, 1861)

---

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과

과명	Geometridae
일반특징	<p>국내는 경기도, 전라북도, 울릉도, 국외는 일본, 중국에 분포한다. 수컷의 더듬이는 실 모양 또는 개 이빨 모양으로 짧은 털이 있고, 암컷의 것은 실 모양이다.</p> <p>몸과 날개는 연한 회황색으로 어두운 색의 비늘이 퍼져 있다. 앞날개의 가로선은 암갈색이고 안쪽 가로선은 중실 안에서 직각보다 작은 각을 이룬다. 중간 가로선은 거의 일직선이고 횡맥은 암갈색이다. 바깥 가로선은 비스듬하게 뻗어 나가다가 안쪽으로 다시 살짝 기운다. 앞쪽 가장자리는 바깥 가로선과 접하여 적갈색 무늬가 있으며, 날개 끝부분은 회백색을 띤다.</p> <p>가장자리 선은 흑갈색이고, 노란 빛이 도는 회백색의 부드러운 털이 있다.</p> <p>뒷날개에는 안쪽 가로선이 없으며 가장자리 부분이 어두운 색을 띤다.</p> <p>뒷면에는 앞면과 같은 무늬가 나타나지만, 가장자리가 넓게 암갈색을 띤다.</p> <p>날개 길이는 약 25mm이다.</p> <p>8~9월에 나타난다.</p>