



등근잎유홍초 / *Quamoclit coccinea* Moench

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 나팔꽃속 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과국명 | 메꽃과 |
| 과명 | Convolvulaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 메꽃과 덩굴성 한해살이풀로 전국 각지의 빈 땅이나 사람이 사는 집 근처에서 자라며 관상용으로 재배하거나 야생에서 자란다. 북미, 중국, 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ▶북미, 중국, 일본 등지에 분포▶국내에는 전국 각지의 빈터나 인가 근처에 귀화 관상용으로 재배하고 야생화하였다.</p> <p>형태 : 덩굴성의 한해살이풀 .</p> <p>크기 : 길이가 1-2m 가량된다.</p> <p>꽃색 : 붉은색,노란색</p> <p>개화기 : 9월,8월</p> <p>잎은 어긋나고 잎자루가 있다. 잎몸은 심장 같은 둥근 모양이다. 끝이 갑자기 좁아지고 뾰족하며 아랫부분에 있는 양쪽 귀 모양의 밑이 각져 있다.</p> <p>가장자리가 밋밋하다.</p> <p>꽃은 8~9월에 붉은빛이 도는 노란색으로 피고 잎겨드랑이에서 긴 꽃자루가 자라 그 끝에 3~5개의 꽃이 달린다. 꽃은 깔때기 모양이다. 꽃받침은 끝이 5개로 갈라지고, 꽃받침조각의 끝이 가시 같은 돌기처럼 되어 있으며 길이가 각각 다르다. 꽃잎 전체는 판통이 길며 판연은 짧고 얇게 5개로 갈라진다. 수술은 5개이고 암술대는 1개인데 꽃부리 밖으로 약간 나온다. 수술대와 암술대는 주홍색이나 꽃가루주머니와 암술머리는 하얀색이다.</p> <p>열매는 삭과고 둥근 모양이며 털이 없다. 아랫부분이 꽃받침에 싸여 있으며 4개의 씨앗이 있다.</p> <p>줄기는 가늘고 왼쪽으로 감기면서 길게 뻗는다.</p> <p>유홍초와 비슷하지만 잎이 갈라지지 않기 때문에 둥근잎유홍초라고 한다.</p> |