



: 2025 12 13 2:33



뒤흰띠알락나방 / *Chalcosia remota* (Walker, 1854)

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 곤충    |
| 속국명  |       |
| 과국명  | 알락나방과 |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Zygaenidae  |
| 일반특징 | <p>앞날개의 길이는 25~30mm이다. 수컷의 더듬이는 빗살 모양이고, 얼굴은 앞쪽으로 튀어나왔다. 가슴은 검은 바탕에 파란 광택이 나고 긴 털이 덮여 있다. 머리는 견눈을 제외하고 붉은 빛이 돌며, 더듬이와 배의 등쪽은 검은 바탕에 초록색 광택이 난다.</p> <p>배는 흰색이며 잔 털이 빽빽하게 모여 있다.</p> <p>앞날개에는 노란 띠가 있고, 뒷날개에는 가운데 부분에 옅은 노랑 무늬가 발달해 있다. 꼬마흰띠알락나방과 모습이 비슷하지만 크기는 매우 차이가 난다.</p> <p>애벌레의 몸길이는 25mm이며, 머리는 검은색이며 광택이 난다. 배마디 등쪽에 노란 무늬가 있고, 가늘고 짧은 흰색 털이 나 있다.</p> <p>1년에 한 번 나타나며 애벌레는 4월경부터 관찰된다. 보통 5월 중순 경에 성장을 마치지만 추운 지방에서는 6월에도 애벌레를 볼 수 있다. 백갈색의 단단한 고치를 만들고 번데기로 변한 후, 6~7월에 성충이 된다. 주로 산간 지방에서 볼 수 있으며 잎을 갉아 먹는다.</p> |