



뒷검은그물가지나방 / *Cabera griseolimbata* (Oberthur, 1879)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과

과명	Geometridae
일반특징	<p>국내는 경기도, 전라북도, 울릉도, 국외는 일본, 중국, 일본, 남서 시베리아에 분포한다. 더듬이는 수컷이 빗살 모양이고, 암컷은 실 모양이다. 몸과 날개는 모두 옅은 황색이며, 아랫입술수염의 배면은 다소 갈색을 띤다.</p> <p>가슴, 배 및 어깨판에는 암갈색의 가느다란 점이 퍼져 있으며 날개에도 동일한 색의 짧은 선이 흩어져 있다.</p> <p>앞, 뒷날개는 가운데 갈라져 있는 맥 부분이 암갈색으로 물들어 있다.</p> <p>앞날개에 있는 가로선 역시 암갈색이며, 날개 뒤쪽 끝부분은 넓게 암회갈색을 띤다. 부드러운 털은 연한 노란색과 암갈색이 얼룩덜룩한 무늬를 이루고 있다. 뒷날개의 앞면도 앞날개와 비슷한 색과 모양을 하고 있다. 뒷면은 옅은 노란색으로 짙은 갈색의 짧은 선이 흩어져 있으며, 앞날개 가로선들은 모두 암갈색이나 뒷날개에는 안쪽 가로선이 없다. 또, 앞날개의 끝부분은 짙은 갈색이다. 부드러운 털은 앞면과 같다. 날개 길이는 22~23mm이다.</p> <p>5~6월과 7~8월에 나타난다.</p>