

: 2025 11 6 12:23



등골나물 / Eupatorium japonicum Thunb.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	등골나물속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과 여러해살이풀로 꽃을 보기 위해 기르는 식물이기도 하다. 우리나라의 각지에서 볼 수 있으며 일본, 중국에서도 볼 수 있다. 분포지역: ▶한국, 일본, 중국 등지에 분포한다. ▶전국에 분포한다. 형태: 숙근성 여러해살이풀로 관화식물이다. 크기: 높이가 2m에 달한다. 꽃색: 붉은색,자주색 개화기: 9월,8월,7월,10월 밑부분의 잎은 작으며 꽃이 필 때쯤 되면 없어진다. 가운데의 큰 잎은 마주나기하고 잎자루가 짧으며 달걀 같은 긴 타원 모양 또는 타원 모양이다. 또한, 끝이 뾰족하다. 밑부분에는 규칙적이고 뾰족한 톱니가 있다. 양면에 털이 있고 뒷면에 분비물을 내보내는 투명한 점이 있다. 잎맥은 6~7쌍으로서 위로 갈수록 길어지고 좁아진다. 꽃은 7~10월에 하얀색 또는 연붉은 자주색으로 피고 원줄기 끝의 편평꽃차례에 달린다. 총포는 원통 모양이다. 낱꽃은 5개씩이며 비늘잎은 두줄로 배열되는데, 바깥 것이 훨씬 짧으며 원두이다. 열매는 수과이고 원통 모양이다. 선과 털이 있으며 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 하얀색이다. 줄기는 높이가 2m에 이르고 거의 가지를 치지 않는다. 줄기에는 자주색 점이 있으며 가지에는 꼬부라진 털이 있다. 땅속줄기는 옆으로 뻗고 뿌리가 드문드문 내린다. 반그늘에서도 자라지만 해가 드는 풀숲에서 자란다. 식물이 썩어서 만들어내는 유기물이 많고, 모래가 적게 섞인 보드라운 흙이 적합하다. 또한 습기가 있는 땅이라면 어디서나 잘 자란다.