



: 2026 2 10 2:20



등골나물 / *Eupatorium japonicum* Thunb.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 등골나물속 |
| 과국명 | 국화과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Compositae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 국화과 여러해살이풀로 꽃을 보기 위해 기르는 식물이기도 하다. 우리나라의 각지에서 볼 수 있으며 일본, 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 일본, 중국 등지에 분포한다.►전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 숙근성 여러해살이풀로 관화식물이다.</p> <p>크기 : 높이가 2m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 9월, 8월, 7월, 10월</p> <p>밑부분의 잎은 작으며 꽃이 필 때쯤 되면 없어진다. 가운데의 큰 잎은 마주나기하고 잎자루가 짧으며 달걀 같은 긴 타원 모양 또는 타원 모양이다. 또한, 끝이 뾰족하다. 밑부분에는 규칙적이고 뾰족한 톱니가 있다. 양면에 털이 있고 뒷면에 분비물을 내보내는 투명한 점이 있다. 잎맥은 6~7쌍으로서 위로 갈수록 길어지고 좁아진다.</p> <p>꽃은 7~10월에 하얀색 또는 연붉은 자주색으로 피고 원줄기 끝의 편평꽃차례에 달린다. 총포는 원통 모양이다. 날꽃은 5개씩이며 비늘잎은 두 줄로 배열되는데, 바깥 것이 훨씬 짧으며 원두이다.</p> <p>열매는 수과이고 원통 모양이다. 선과 털이 있으며 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 하얀색이다.</p> <p>줄기는 높이가 2m에 이르고 거의 가지를 치지 않는다. 줄기에는 자주색 점이 있으며 가지에는 꼬부라진 털이 있다.</p> <p>땅속줄기는 옆으로 뻗고 뿌리가 드문드문 내린다.</p> <p>반그늘에서도 자라지만 해가 드는 풀숲에서 자란다. 식물이 썩어서 만들어내는 유기물이 많고, 모래가 적게 섞인 보드라운 흙이 적합하다. 또한 습기가 있는 땅이라면 어디서나 잘 자란다.</p> |