

: 2025 11 6 9:02



딱지꽃 / Potentilla chinensis Ser.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	양지꽃속
과국명	장미과

요약설명: 장미과 여러해살이풀로 우리나라의 제주도, 전라남도, 전라북도의 덕유산, 경상남도의 금정산, 경상북도의 팔공산, 충청도, 강원도의 치악산, 경기도의 광릉, 황해도, 평안북도, 함경남도의 야생에서 자란다. 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에서도 볼 수 있다. 분포지역: ▶한국, 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 30~60cm 가량이다. 꽃색: 백색 개화기: 6월,7월 잎은 깃모양겹잎이다. 뿌리에서 난 잎은 옆으로 퍼지고 줄기잎은 어긋난다. 작은 잎은 15~29개인데 밑부분의 것은 점차 작아지고 윗부분의 것은 거꿀피침모양 또는 긴 타원 모양이다. 겉면에는 털이 거의 없으나 뒷면에는 하얀색 솜털이 촘촘하게 나 있고 특히 맥 위에 길고 부드러운 털이 있다. 턱잎은 넓은 타원 모양이며 깃털 모양으로 갈라진다. 꽃은 6~7월에 노란색으로 피고 줄기나 가지 끝에서 평평한 취산꽃차례를	과명	Rosaceae
이문다. 놓자두는 가들며, 놓을 검짜는 작은 앞은 온마닥 모양으로 걸다진다. 꽃받침조각은 좁은 달걀 모양이고 예두며 덧꽃받침조각은 창 모양이고 뒷면에 흰 솜털이 있다. 꽃잎은 5개이고 거꾸로 선 달걀 모양 같은 요두이다. 열매는 수과고 넓은 달걀 모양이며 세로로 주름이 져 있고 모가 진 선이 있다. 줄기는 높이 30~60cm이고 모여나기한다. 거칠고 크며 부드러운 털이 있다. 땅속에 긴 원기둥 모양의 뿌리가 있으며 흑갈색이고 굵다. 개울가의 들이나 바닷가에서 자란다. 씨앗이나 뿌리나누기에 의해 번식한다.	일반특징	덕유산, 경상남도의 금정산, 경상북도의 팔공산, 충청도, 강원도의 치악산, 경기도의 광릉, 황해도, 평안북도, 함경남도의 야생에서 자란다. 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에서도 볼 수 있다. 분포지역: ▶한국, 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 30~60cm 가량이다. 꽃색: 백색 개화기: 6월,7월 잎은 깃모양겹잎이다. 뿌리에서 난 잎은 옆으로 퍼지고 줄기잎은 어긋난다. 작은 잎은 15~29개인데 밑부분의 것은 점차 작아지고 윗부분의 것은 거꿀피침모양 또는 긴 타원 모양이다. 겉면에는 털이 거의 없으나 뒷면에는 하얀색 솜털이 촘촘하게 나 있고 특히 맥 위에 길고 부드러운 털이 있다. 턱잎은 넓은 타원 모양이며 깃털 모양으로 갈라진다. 꽃은 6~7월에 노란색으로 피고 줄기나 가지 끝에서 평평한 취산꽃차례를 이룬다. 꽃자루는 가늘며, 꽃을 감싸는 작은 잎은 손바닥 모양으로 갈라진다. 꽃받침조각은 좁은 달걀 모양이고 예두며 덧꽃받침조각은 창 모양이고 뒷면에 흰 솜털이 있다. 꽃잎은 5개이고 거꾸로 선 달걀 모양 같은 요두이다. 열매는 수과고 넓은 달걀 모양이며 세로로 주름이 져 있고 모가 진 선이 있다. 줄기는 높이 30~60cm이고 모여나기한다. 거칠고 크며 부드러운 털이 있다. 땅속에 긴 원기둥 모양의 뿌리가 있으며 흑갈색이고 굵다.