



뚝사초 / *Carex thunbergii* var. *appendiculata* (Trautv. & C.A.Mey.) Ohwi

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 경기도와 강원도를 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 경기도, 강원도 이북에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀 이다.</p> <p>크기 : 높이는 20~80cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색, 자주색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 마르면 가장자리가 안쪽으로 감긴다. 밑부분의 잎집은 나뭇잎 모양 또는 잎몸이 없고, 마르면 갈색 또는 회갈색으로 변하며 자줏빛이 섞인 부분도 있다.</p> <p>꽃은 5~7월에 피고 3~5개의 작은 이삭이 달린다. 위쪽의 작은 이삭은 갈색 선모양이며 수꽃이 달린다. 아래쪽의 작은 이삭은 긴 타원 모양 또는 원기둥 모양의 암꽃이 달린다. 가장 밑에 있는 꽃을 감싸는 잎은 짧은 나뭇잎 모양이다. 암꽃의 비늘 조각은 긴 타원 같은 달걀 모양이며 끝이 뭉툭하다. 열매는 수과이고 둥근 렌즈 모양이며 양면에 가는 맥이 있다. 열매를 싸고 있는 주머니는 달걀 모양이고 부리가 몹시 짧다.</p> <p>줄기는 높이가 20~80cm이고 모여나기한다.</p> <p>논둑이나 냇가의 습지에서 자란다.</p>