



마삭줄 / *Trachelospermum asiaticum* (Siebold & Zucc.) Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	마삭줄속
과국명	협죽도과

과명	Apocynaceae
일반특징	<p>요약설명 : 협죽도와 상록 활엽 덩굴성 식물로 우리나라의 전라도, 경상남도, 제주도에서 자라며 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본; 전라남북도, 경상남도, 제주도.</p> <p>형태 : 상록 활엽 덩굴성.</p> <p>크기 : 길이 5m.</p> <p>꽃색 : 노란색, 백색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 타원 모양, 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이다. 겉면에는 윤기가 있고 가장자리가 밋밋하다.</p> <p>꽃은 6월 초~7월 말에 핀다. 하얀색에서 노란색으로 변한다. 가지 끝 또는 잎겨드랑이에서 취산꽃차례를 이룬다. 꽃받침은 5개로 깊게 갈라진다. 꽃잎 전체는 5갈래로 갈라진다. 수술도 5개이며 판통에 붙어 있고, 꽃가루주머니의 끝이 통 모양 입구까지 닿는다.</p> <p>열매는 골돌과고 2개가 서로 평행하거나 직각보다 작은 각을 이룬다. 8월 말~10월 중순에 익는다.</p> <p>나무껍질은 적갈색이고 줄기에서 뿌리가 내려 다른 물체에 잘 붙는다.</p> <p>추위에는 약하나 음지나 양지 모두에서 자라는 것이 양호하다.</p> <p>해안지방에서도 잘 자라며 대기오염에도 강한 편이다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이하여 번식시킨다. 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 힘이 강하다.</p>