

: 2025 11 7 12:01



만첩조팝나무 / Spiraea prunifolia Siebold & Zucc.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	조팝나무속
과국명	장미과

이야서며 : 자미과 과모으로 우리 되어 나나이 이부에 서 보 스 이다	과명	Rosaceae
분포지역: 일본, 한국. 형태: 관목 크기: 높이 3m이다. 꽃색: 자주색,갈색 개화기: 5월,7월,8월 잎몸은 달걀 모양 또는 타원 같은 창 모양이다. 처음에는 잎 양면에 털이 있다가 나중에는 잎 윗면에만 있거나 점점 사라진다. 잎맥은 깃털 모양이고, 잎의 밑부분은 쐐기모양이며, 잎의 가장자리는 꼭대기에서 중간까지 또는 밑부분까지 날카롭게 갈라진 톱니가 있다. 잎의 끝부분은 예두이다. 우산모양꽃차례이고 꽃이 3~6개가 달린다. 꽃자루에는 털이 있다. 열매는 골돌과이고 털이 없거나 열매가 터지는 선을 따라 털이 있기도 하다. 어린 가지는 적갈색이지만, 나중에 어두운 갈색 또는 흑갈색으로 변한다. 가늘고 약간 각이 있으며, 처음에는 부드러운 털이 있다가 나중에는 잔털이	일반특징	형태: 관목 크기: 높이 3m이다. 꽃색: 자주색,갈색 개화기: 5월,7월,8월 잎몸은 달걀 모양 또는 타원 같은 창 모양이다. 처음에는 잎 양면에 털이 있다가 나중에는 잎 윗면에만 있거나 점점 사라진다. 잎맥은 깃털 모양이고, 잎의 밑부분은 쐐기모양이며, 잎의 가장자리는 꼭대기에서 중간까지 또는 밑부분까지 날카롭게 갈라진 톱니가 있다. 잎의 끝부분은 예두이다. 우산모양꽃차례이고 꽃이 3~6개가 달린다. 꽃자루에는 털이 있다. 열매는 골돌과이고 털이 없거나 열매가 터지는 선을 따라 털이 있기도 하다. 어린 가지는 적갈색이지만, 나중에 어두운 갈색 또는 흑갈색으로 변한다. 가늘고 약간 각이 있으며, 처음에는 부드러운 털이 있다가 나중에는 잔털이 된다. 꽃눈은 달걀 모양이고 작으며 비늘로 덮여 있다. 또한 털이 없으며 끝이 날카롭게 생겼다.