

: 2025 11 7 3:58



머루 / Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.

구분	설명
생물분류 -	식물
속국명	포도속
과국명	포도과

과명	Vitaceae
일반특징	요약설명: 포도과 낙엽 활엽 덩굴성으로 일본, 전국, 울릉도에 분포한다. 분포지역: 일본; 전국, 울릉도에 분포. 형태: 낙엽 활엽 덩굴성. 크기: 길이 10m. 꽃색: 녹색 개화기: 6월 잎은 어긋나기하며 심장형 또는 원형이고 5개로 얕게 갈라진다. 잎에 작은 삼각형의 톱니가 있고 어린잎은 전체에 붉은 갈색의 털이 있다. 5월 중순~7월 말에 연두색 꽃이 핀다. 꽃은 원뿔모양꽃차례로 피고 보통 덩굴손 꽃대 밑부분에서 발달한다. 열매는 토마토처럼 여러개의 씨가 들어있는 장과로 공모양이며 검푸른색이다. 열매가 송이로 되어 밑으로 처지며 씨앗은 거꿀달걀모양이고 9~10월에 익는다. 일년생가지는 뚜렷하지 않은 능선이 있으며 붉은 빛이 돌고 어릴 때는 별모양 털로 덮여 있다. 다래와 더불어 야생열매의 대표적인 덩굴식물이다. 바위 위나 다른 나무 위로 기어올라 울창한 정글을 만든다.