



먹세줄흰가지나방 / *Myrteta angelica* Butler, 1881

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과

과명	Geometridae
일반특징	수컷의 더듬이는 빗살 모양이고, 암컷의 것은 실 모양이다. 몸과 날개는 흰색이며 정수리, 이마, 아랫입술수염, 앞가슴 다리의 안쪽은 어두운 갈색을 띤다. 앞날개에는 비스듬한 줄이 3개 있다. 가장자리에는 짧고 가는 암갈색 선이 흩어져 있으며, 날개 뒤쪽 끝부분에는 작은 암갈색 무늬가 있다. 가장자리선은 검은색이고, 암갈색의 부드러운 털이 있다. 뒷날개는 암갈색과 주황색이 섞인 2개의 선이 가늘고 비스듬하게 나 있으며 그 바깥쪽 날개 끝부분은 주황색을 띤다. 가장자리 부분에는 암갈색의 짧은 선이 소수 흩어져 있으며 제 2주맥 부분에는 암갈색 무늬가 1개 있다. 가장자리 선은 주황색이며, 담황색의 부드러운 털이 있다. 뒷면은 회백색으로 앞날개의 가장자리 부분은 넓게 암갈색을 띠고 가장자리 선과 털도 암갈색이다. 뒷날개는 가장자리 부분에 갈색의 짧은 선이 흩어져 있으며 가장자리 선은 갈색, 부드러운 털은 담황색이다. 날개 길이는 35mm 내외이다. 국내는 강원도, 국외는 일본, 타이완에 분포한다. 7월에 볼 수 있다.