



메추라기 / Coturnix japonica

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	평과
과명	Phasianidae
일반특징	수컷은 이마, 머리꼭대기, 뒷머리가 검은색이며, 각 깃털의 가장자리는 붉은 갈색으로 폭이 넓다. 목, 윗등, 허리, 위꼬리덮깃은 붉은 녹색으로 각 깃털 끝에는 검은색의 삼각형 무늬가 있으며, 중앙에는 크림색의 축이 되는 반점이 있다. 이마 옆으로부터 눈 위를 지나 뒷목에 걸쳐 크림색이 도는 흰색의 눈썹선이 있다. 귀깃, 뺨, 턱밑, 턱 아래 부위는 붉은 갈색이며, 턱밑과 턱 아래 부위 중앙은 검은색이다. 가슴은 붉은 녹색으로 흰색의 축이 되는 반점이 있고, 배는 크림색이 도는 노란색이다. 옆구리는 붉은 갈색으로 크림색을 띤 흰색의 삼각형 축이 되는 반점이 있다. 부리는 잿빛 갈색으로 끝 가까이는 검은색이다. 다리는 옅은 살구색이다. 겨울을 나는 곳에서는 풀과 키 작은 나무가 있는 풀밭, 들판, 낮은 언덕, 험한 산에 이르는 땅과 강의 고틀머리 부분에서 지낸다. 짝짓기철에는 암수 한 쌍이 함께 생활한다. 둥지는 땅을 오목하게 파서 안에 마른 풀을 깔아서 만든다. 알을 낳는 시기는 5월 말에서 9월 초이다. 알은 옅은 황회색 바탕에 어두운 갈색의 얼룩무늬가 있으며, 7~12개 낳아 16~21일 동안 품는다.