_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 6월 16일 5:16 오후

밀가루줄명나방 / Pyralis farinalis Linnaeus, 1758

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	명나방과

과명	Pyralidae
일반특징	머리는 백갈색이고 이마는 다소 둥글고 튀어나와 있다. 더듬이는 작은 털이 있는 실 모양이다. 아랫입술수염은 이마와 가깝고 위쪽으로 향해 있으며 바깥쪽이 갈색을 띤다. 가슴의 배쪽면과 배는 황갈색이며 다리는 옅은 황갈색에 붉은 빛이 돈다. 앞날개는 노란색이고 갈색 비늘 조각이 섞여 있다. 날개가 시작되는 부분의 무늬는 둥글고 적갈색이며, 앞가장자리 1/4에서 시작하여 뒷 가장자리 1/3에 닿는다. 바깥선은 흰색으로 심하게 굴곡져 있으며 앞 가장자리는 넓고 뒤쪽으로 갈수록 좁아진다. 그 선의 바깥쪽은 적갈색이며 앞 가장자리 색이 더 뚜렷하다. 뒷날개는 옅은 갈색으로 덮여 있고 가운데 가로선과 바깥 가로선은 흰색으로 뚜렷하며 가장자리를 따라 검은 반점이 선명하게 배열되어 있다. 일본에 분포한다. 1년에 두 번 나타난다. 첫 번째 성충은 6월경에 나타나고, 늦게 발생하여 7월에 부화한 애벌레는 거의 다 성장하여 겨울을 난다. 애벌레는 저장곡물, 과자류, 마른 과일류 등을 갉아 먹는 해충이다. 대부분 다자란 애벌레의 모습으로 월동하지만 어린 애벌레로 겨울을 나는 경우도 있다.