

_어린이 생물도감

: 2026 2 16 7:46



바위고사리 / *Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon

구분	설명
생물분류	식물
속국명	바위고사리속
과국명	고사리과

과명	Pteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리과 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속하며 제주, 전남(대흑산도), 경남(동래, 진양)에 나며 일본, 류우큐우, 대만, 중국을 비롯하여 열대에 널리 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주, 전남(대흑산도), 경남(동래, 진양)에 나며 일본, 류우큐우, 대만, 중국을 비롯하여 열대에 널리 분포한다.</p> <p>형태 : 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속한다.</p> <p>크기 : 높이가 40~80cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색, 주황색</p> <p>개화기 : 8월</p> <p>잎은 모여나기하며 긴 타원모양이고 3~4회 날개깃모양으로 갈라진다. 잎은 연두색이나 햇볕에 그을려 자적색으로 된 것이 많다. 잎자루는 갈색이고 매끈하다.</p> <p>포자낭군은 잎맥 끝에 1개씩 나며 때로 2~3개의 맥에 연결되어 옆으로 길게 되기도 한다. 포막은 둥근 콩팥모양으로 가장자리가 빛나고 있다.</p> <p>뿌리줄기는 굵고 짧으며 땅속 옆으로 뻗는다. 뿌리줄기와 잎자루의 아랫 부분에 털 같은 갈색 비늘조각이 있다.</p> <p>연두색의 부드러운 새잎이 나올 때 관상가치가 매우 높다.</p>