



반백잎말이나방 / *Clepsia rurinana* (Linnaeus, 1758)

| 구분   | 설명     |
|------|--------|
| 생물분류 | 곤충     |
| 속국명  |        |
| 과국명  | 잎말이나방과 |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Tortricidae  |
| 일반특징 | <p>한쪽 날개 끝에서 반대쪽 날개 끝의 길이는 18~20mm이고, 암컷은 14~17mm이다.</p> <p>머리와 가슴은 오렌지색이며, 앞날개는 옅은 황토색이고 좁은 편이다. 앞날개는 날개주름이 있으나, 아주 좁고 짧다. 날개가 시작되는 부분은 어두운 갈색이고, 중간 부분은 갈색이며, 이 부분은 앞 가장자리의 중간에서 출발하여 뒷 가장자리의 중간에서 날개 끝까지 닿도록 넓어진다. 뒷날개는 옅은 갈색을 띤다.</p> <p>수컷 생식기의 딸린기관은 길며, 등 쪽 면이 거의 직선에 가깝다. 구상돌기는 짧으나, 끝이 넓적하지는 않다.</p> <p>국내는 경기도 수원시, 강원도 영월군 치악산, 경기도 의왕시 청계산, 전라북도 정읍시 내장산, 경기도 광릉시, 국외는 일본, 중국, 인도, 러시아, 유럽에 분포한다. 일본잎갈나무를 먹는다.</p> |