



: 2026 2 5 12:42



강계버들 / *Salix kangensis* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 소교목으로 북부지방에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 북부지방에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소교목</p> <p>크기 : 높이 5-7m, 지름 7cm</p> <p>꽃색 : 검정색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 점첨두이다. 잎 표면은 녹색이고 주맥에 잔털이 있으며 뒷면도 연한 녹색으로 잔털이 있다. 잎의 잔톱니 끝이 밖을 향하며 잎자루에는 털이 있다.</p> <p>꽃은 꼬리모양꽃차례로 잎보다 먼저 핀다. 수꽃은 꽃대축에 촘촘한 털이 있다. 꽂턱잎은 계란형이고 끝이 검은색이며 긴 털이 있다. 암꽃의 꽂턱잎은 거꿀달걀모양으로 윗부분이 검은색이며 긴 털이 있고 꿀샘은 1개이다.</p> <p>씨방은 대가 있으며 긴 달걀모양이고 암술대가 매우 길며 암술머리는 4개이다.</p> <p>열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다.</p> <p>줄기는 가지가 위를 향한다. 일년생가지는 초록색 또는 연두색으로서 처음에는 털이 있으나 점차 없어지며 겨울눈에 털이 있다.</p> <p>선버들과 비슷하지만 잎 뒷면에 털이 있고 수술이 2개이며 암꽃에 1개의 꿀샘이 있는 것이 다르다.</p>