



발뚝외풀 / *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox

구분	설명
생물분류	식물
속국명	발뚝외풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 한해살이풀로 제주도와 울릉도, 경기도 이남에 분포한다. 분포지역 : 제주도와 울릉도, 경기도 이남에 분포한다. 형태 : 한해살이풀이다. 크기 : 높이 7~15cm이다. 꽃색 : 자주색,붉은색 개화기 : 8월,7월 잎은 마주나기하고 긴 타원형으로 끝이 둔하고 맥이 뚜렷하며 가장자리는 밋밋하다. 7~8월에 연한 붉은자주색 꽃이 핀다. 꽃은 잎겨드랑이에서 1개씩 나오며 꽃부리 끝이 입술모양이다. 열매는 익으면 껍질이 말라 찢개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 긴 타원형이고 가을철에 흔히 달힌꽃이 달린다. 줄기에 털이 없으며 아랫 부분에서부터 가지가 갈라져 비스듬히 선다. 외풀과 비슷하지만 뚝 근처의 습지에서 자라기 때문에 발뚝외풀이라고 하며 논뚝에서도 흔히 자란다.</p>