



강활 / *Ostericum praeteritum* Kitag.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	당귀속

과국명	산형과
과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 속근성 두해살이풀 또는 여러해살이풀로 우리나라, 중국 동북, 우수리에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국 동북, 우수리에 분포▶경북, 강원, 경기, 평북, 함남, 함북에 야생 또는 재배</p> <p>형태 : 속근성 두해살이풀 또는 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 2m</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>잎은 어긋나기하고 이회삼출 잎으로서 달걀모양으로 갈라지며 끝이 뾰족하고 가장자리에 톱니가 있다. 잎 뒷면의 맥위에 털이 약간 있다. 작은잎자루는 밑부분의 것은 길지만 위로 가면서 점차 짧아지며 잎자루 밑부분이 넓어져서 앞집이 된다.</p> <p>꽃은 겹우산모양꽃차례로 가지끝과 원줄기 끝에 열리고 10~30개로 갈라져서 많은 꽃이 핀다. 꽃은 8~9월에 피고 흰색이며 총포조각은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 1~2개이고 소총포조각은 6개 정도이며 얇고 길쭉한 모양이다.</p> <p>열매는 타원형으로 번두리에 넓은 날개가 있다. 열매가 익으면 껍질이 쪽으로 갈라진다.</p> <p>줄기는 윗부분에서 가지가 갈라진다. 자주빛의 줄기는 한 개 또는 여러 개가 생긴다. 원뿌리는 썩어 없어져도 옆에 싹이 생겨서 다시 자란다.</p>