



백송애기잎말이나방 / *Gravitarmata margarotana* (Heinemann, 1863)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	백송애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>아랫입술수염은 가늘고 길며, 앞으로 뻗어 있다. 제 2마디는 크게 늘어나지 않았으며, 제 3마디는 길고 약간 아래로 처져 있다.</p> <p>날개 길이는 16~20mm이다. 앞날개에는 회갈색, 적갈색, 흑갈색의 비늘털로 만들어진 불규칙한 구름 모양의 무늬들이 있다. 날개 끝에는 활처럼 흰 곡선 모양의 흰색 점이 있다. 뒷날개는 회갈색, 가장자리는 암갈색이고, 옆은 회색의 부드러운 털이 있다.</p> <p>애벌레의 몸길이는 11 mm 정도이고 머리는 다갈색, 몸은 붉은 색이다.</p> <p>1년에 한 번 나타난다. 약 2주 동안 나뭇가지 또는 가늘고 뾰족한 잎 위에 알을 낳는다. 애벌레는 5월 상, 중순에 부화한다. 거의 성장을 끝낸 애벌레가 되면 마른 가지와 낙엽, 잡초 사이에 실을 토해 고치를 만들어 번데기가 된 후 겨울을 난다.</p> <p>애벌레는 소나무류의 열매 및 새로 돌아난 싹을 해치는 해충으로, 피해를 받은 나무는 생장이 순조롭지 못하며 열매는 일찍 말라 떨어지게 된다.</p>