

: 2025 11 7 6:22



버들꼬마잎벌레 / Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)

구분	설명
생물 분 류	곤충
속국명	버들꼬마잎벌레속
과국명	잎벌레과
과명	Chrysomelidae
일반특징	몸길이는 3.3~4.4mm 정도이고 모양은 둥글며 색은 검은색이다. 날개는 광택이 나고 푸른빛이 도는 남색이다. 앞날개에 불규칙한 점무늬가 있다. 어린 애벌레는 등에 검은색 돌기가 있어서 검게 보이며, 성장한 애벌레는 황백색이고 등에 검은 줄모양의 돌기가 있다. 알은 긴 타원형이고 초반에는 황백색이지만 시간이 지나면 노랗게 변한다. 겨울을 난 성충은 4월 중순에 나와 햇가지 끝에 있는 잎의 뒷면에 10~30개의 알을 낳는다. 알의 모습으로 5일을 있다가 3주 동안 애벌레로 지낸다. 애벌레는 집단 생활을 하며 잎을 먹는데 잎 뒷면에 꼬리를 붙이고 번데기가된다. 번데기로 있는 기간은 4~5일이며 5월에 성충이 나타난다. 애벌레와 성충은 11월까지 볼 수 있다. 버드나무류의 주요한 해충으로 성충과 애벌레가 새 잎을 파먹는다. 어린 애벌레와 성장하는 중인 애벌레는 모여서 잎살만 먹으며 피해가 심하면나무의 기운이 약해져 생장에 지장을 준다. 낙엽이나 마른 풀 밑에서 무리를지어 성충의 모습으로 겨울을 난다.