

 _어린이 생물도감

날짜 : 2025년 5월 3일 12:57 오전



병어리빠꾸기 / *Cuculus saturatus*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	두견이과
과명	Cuculidae
일반특징	암컷과 수컷 모두 몸 윗면은 푸른색을 띤 시멘트색이다. 턱 밑과 그 아래, 윗가슴은 진한 푸른 회색이다. 아래가슴, 옆구리, 배는 옅은 노란갈색에 검은색의 가로띠가 있다. 암컷은 윗가슴은 종종 녹색을 띠며, 몇 개의 좁은 가로띠가 있는 경우도 있다. 아래꼬리덮깃과 아랫배는 진한 노란갈색 바탕에 검은색의 가로띠가 있으나 불완전하거나 전혀 없는 경우도 있다. 부리는 뿔 빛 갈색이며 뒷부분은 노란색 또는 올리브색이다. 다리는 오렌지빛이 나는 노란색이다. 암컷 중에는 적색형이 많다. 적색형의 몸 윗면은 갈색을 띤 붉은색으로 아름다우며, 일부분에는 어두운 갈색의 가로 얼룩무늬가 있다. 몸 아랫면은 옅은 노란갈색으로 검은색의 가로띠가 있다. 숲에서 주로 혼자 생활한다. 직접 둥지를 만들지 않고 숲새, 동박새, 축새, 휘파람새의 둥지에 알을 맡겨서 알 품기와 새끼 돌보기를 시킨다. 알을 낳는 시기는 5월 초에서 6월 말이다. 알은 흰색 바탕에 갈색의 작은 얼룩점이 있으며, 1개의 둥지에 1개의 알을 낳는다.