



벼슬집명나방 / *Locastra muscosalis* (Walker, 1866)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	명나방과

과명	Pyralidae
일반특징	날개의 길이는 30~38mm이다. 수컷의 더듬이 마디에는 아주 긴 털로 이루어진 돌기가 있다. 아랫입술수염은 가늘고 검은빛을 띤 짙은 갈색이며 위로 향해 있다. 머리는 검은색이고 더듬이는 갈색에 약간 검은 색이 섞여 있다. 1년에 한 번 나타난다. 겨울을 난 애벌레는 6월 중, 하순에 번데기가 되고 그 모습으로 16일을 보낸다. 6월 하순~7월 하순에 성충이 되며 가장 많이 나타날 때는 7월 10일 즈음이다. 성충이 알을 낳는 개수는 약 550개이고, 알 표면에 무더기로 낳은 알은 약 11일 후에 부화한다. 애벌레는 거미줄로 잎을 말고 무리지어 살며 잎살만을 먹지만 성장하면 1~3마리씩 나뉘어져 잎을 갉아 먹는다. 이후 9월 중순부터 흙 속에 1cm정도 들어가 평평한 타원형 고치를 만들어 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.