



별박이자나방 / *Naxa seriaria* (Motschulsky, 1866)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과

과명	Geometridae
일반특징	<p>몸과 날개는 흰색이며 날개는 거의 투명에 가깝다. 더듬이는 암수 모두 톱니 모양이다.</p> <p>앞날개 안쪽 가로선 위에는 3개의 검은 점이 있다. 앞, 뒷날개 모두 가로로 뻗어 있는 맥 위에 크고 검은 무늬가 있다. 바깥 가로선은 검은 점이 줄지어 있는 모양인데 가장자리와 평행하다. 가장자리에도 검은 점으로 이루어진 줄이 있다. 뒷면은 앞면과 같다. 뒷날개에는 날개 가시가 없다.</p> <p>1년에 한 번 나타난다. 겨울을 난 애벌레는 4월부터 잎을 갉아먹다가 5월에 거미줄 사이에서 번데기가 된다. 그 후 6~7월에 성충이 되어 알을 낳고, 그 알은 8월에 부화한다.</p> <p>취퉁나무에 피해가 많으며 애벌레가 잎과 가지에 거미줄을 치고 무리지어 살며 잎을 갉아 먹기 때문에 가지만 영성하게 남게 된다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>