

: 2025 11 8 5:52



병아리다리 / Salomonia oblongifolia DC.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	병아리다리속
과국명	원지과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Polygalaceae
일반특징	요약설명: 원지과 1년생 초본으로 일본, 대만, 인도, 말레이시아, 호주, 우리나라(전라북도 남원시, 경상남도 산청군, 부산시)에 분포한다. 분포지역: 일본, 대만, 인도, 말레이시아, 호주 / 한국(전라북도 남원시; 경상남도 산청군; 부산시) 형태: 1년생 초본 크기: 높이 6~30cm 꽃색: 자주색 개화기: 8월,7월 잎은 어긋나기하고 긴 타원형으로 끝이 뾰족하다. 잎 가장자리가 밋밋하지만 윗가장자리에는 가시 같은 털이 약간 있다. 꽃은 7~8월에 피며 연한 자주색이고 이삭꽃차례에 달린다. 열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 납작한 콩팥모양이고 가장자리에 가시같은 털이 있다. 원줄기는 곧추 자라고 털이 없다. 습지에 난다.