



북방기생나비 / *Leptidea morsei* Fenton, 1881

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 기생나비속 |
| 과국명 | 흰나비과 |

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Pieridae |
| 일반특징 | <p>날개 끝에 검은색 무늬가 있는데, 암컷보다 수컷이 짙은 편이고, 봄형의 암컷은 거의 검은색을 띠지 않는다.</p> <p>기생나비와 비슷하게 생겼지만 날개 모양이 둥글다. 또한 봄형의 뒷날개 아랫면에 있는 선명한 검은색 무늬의 모양이 달라서 구별하기 쉽다.</p> <p>봄형은 4월 말~5월, 여름형은 6월 말~7월 및 8월 말~9월에 걸쳐 1년에 세 번 나타난다. 수컷은 오전에 물가에서 물을 먹으며, 풀 위를 날아다니다가 개망초에서 꿀을 먹는다.</p> <p>경기 북부 지방이나 강원도 추운 지방의 초지나 농사짓는 땅에 서식한다.</p> |