_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 8월 3일 12:27 오후

개다래 / Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	다래나무속
과국명	다래나무과

과명	Actinidiaceae
일반특징	요약설명 : 다래나무과 낙엽 활엽 덩굴성으로 중국, 일본, 극동러시아, 우리나라 전국 분포한다. 분포지역 : 중국, 일본, 극동러시아; 전국 분포. 형태 : 낙엽 활엽 덩굴성. 크기 : 길이 5m. 꽃색 : 백색 개화기 : 6월,7월 잎은 어긋나기한다. 얇고 유연한 반투명의 막과 같은 상태로 달걀형, 점첨두며 원저 또는 심장의 모양과 비슷하다. 잎은 표면 전체가 흰색이 되기도 하며 뒷면은 연한 녹색이다. 잎 뒷면에는 연한 갈색 털이 있으며 가장자리에 잔톱니가 있다. 줄기 윗부분의 잎이 하얀 것이 특징이다. 꽃은 향기가 있는 흰색 꽃이 6~7월에 핀다. 꽃은 가지 윗부분의 잎겨드랑이에 달린다. 꽃자루는 연한 갈색 털이 있고 한 꽃자루에 꽃이 1~3개씩 핀다 . 꽃잎과 꽃받침조각이 각각 5개씩 있고 넓은 달걀형이며, 씨방에는 털이 없다. 열매는 달걀모양으로 끝이 뾰족하고 9월 말~10월 초에 노란색으로 익는다. 과육은 혓바닥을 찌르는듯한 맛이 있으며 달지 않다. 일년생가지는 어릴 때 연갈색 털이 있으며 간혹 가시 같은 억센 털이 있고 속이 흰색이며 가득 차 있다. 뿌리는 지표면에 가까운 토양에 분포한다.