



붉은띠굴빛부전나비 / *Coreana raphaelis* (Oberthur, 1881)

| 구분 | 설명 |
|------|------------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 붉은띠굴빛부전나비속 |
| 과국명 | 부전나비과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Lycaenidae |
| 일반특징 | <p>앞, 뒷날개 모두 진한 노란색이고, 날개 가장자리에 연한 갈색 테두리가 있다. 뒷날개 윗면 가장자리의 검은 부분은 수컷이 암컷보다 발달되어 있다. 암컷이 수컷보다 다소 큰 편이고 날개 모양의 폭이 넓으며 둥그스름하다.</p> <p>오전에는 잎 위에서 일광욕을 하거나 이슬을 빨아 먹기도 하지만 꽃에서 꿀을 먹지는 않는다. 낮에는 활동하지 않다가 해 질 무렵에 주로 활동을 시작한다. 암컷은 거의 움직이지 않으며 먹이 식물의 줄기가 갈라진 틈에 1~17개 정도의 알을 낳는다. 알의 형태로 겨울을 난다.</p> <p>낮은 산지의 계곡이나 사람이 사는 집 주변에 서식한다. 6월 중순~7월에 걸쳐 1년에 한 번 볼 수 있다.</p> |