



붉은배새매 / *Accipiter soloensis*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	수리과
과명	Accipitridae
일반특징	일반적 특징 : 암컷과 수컷 모두 머리 꼭대기 뒷부분부터 위꼬리덮깃까지 청색을 띤 어두운 회색이다. 눈앞과 귀 깃은 회색이며, 턱밑과 턱 아래 부위는 크림색을 띤 흰색이다. 가슴과 배는 회색을 띤 녹슨 붉은색이며, 아랫배, 아래꼬리덮깃은 흰색이다, 각진 모양의 꼬리는 어두운 회색을 띤 갈색으로 5가닥의 어두운 갈색 띠가 있다. 부리는 푸른색을 띤 검은색이며, 다리는 황색이다. 생태적 특징 : 주로 평지나, 낮은 언덕 또는 농촌의 사람이 사는 곳 근처의 숲에서 살며, 높은 산의 우거진 숲에서도 볼 수 있다. 둥지는 참나무나 밤나무 등의 나뭇가지에 만들고, 안에는 나뭇잎을 깐다. 알을 낳는 시기는 5월경이며 짝짓기 후 3~5개 정도의 알을 낳는다. 주로 중국과 한국에서 생활하며 새끼를 키우는 여름철새다.