

 _어린이 생물도감

: 2025 5 2 11:32



사과잎말이나방 / *Choristoneura longicellana* (Walsingham, 1900)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	한쪽 날개 끝에서 반대쪽 날개 끝의 길이가 수컷은 19~24mm, 암컷은 23~34mm이다. 더듬이는 길고 갈색이며, 겹눈은 누런빛을 띤 옅은 갈색이고 광택이 난다. 수컷은 배가 작고 가늘며 색이 진하고 배 끝에 털 뭉치가 있다. 또한 앞날개는 누런색이고 앞 가장자리가 크게 굽어 있다. 수컷의 앞날개가 시작되는 부분의 뒤쪽 가장자리에는 검은색 큰 점이 있다. 날개 주름은 날개가 시작되는 부분에서 출발하지 않고 훨씬 지난 지점에서 출발한다. 뒷날개는 누런빛을 띤 연한 갈색이다. 애벌레는 머리가 초록빛이 도는 누런 갈색이고, 입은 어두운 갈색이다. 애벌레의 형태로 나무 껍질이나 낙엽 속에서 겨울을 난다. 5월 말~6월 초순, 6월 말~7월 중순, 7월 말~8월 중순에 나타난다. 기주식물인 사과나무, 배나무류, 자두나무, 복숭아나무, 왕벚나무, 상수리나무, 신갈나무, 떡갈나무, 쥐똥나무, 서양까치밥나무, 장미류, 뽕나무류 등의 잎을 말고 먹는 습성이 있다. 한국, 일본, 중국, 러시아 우수리, 아무르 등지에 분포한다.