

_어린이 생물도감

: 2025 12 14 12:26



사과저녁나방 / *Acronicta intermedia* (Warren, 1909)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	밤나방과

과명	Noctuidae
일반특징	<p>앞날개 길이는 21~25mm이다. 머리와 가슴은 옅은 회색, 배는 누런빛을 띤 갈색이다. 앞날개는 옅은 회색이고 칼 모양의 검은 무늬가 있다. 뒷날개는 누런빛을 띤 흰색으로 뚜렷한 무늬가 없다.</p> <p>애벌레는 몸길이 약 45mm이고 머리는 검은색, 몸은 자줏빛을 띤 검은색이다. 등과 숨구멍 선에 조금 붉은빛을 띤 누런색 띠가 있다. 몸 전체에 있는 검은색 긴 털은 몸길이의 1/3정도이고 털 끝은 하얀색이다.</p> <p>1년에 두 번 나타난다. 첫 번째 성충은 5~6월에 나타나고 애벌레는 6월에 나타나 잎을 갉아 먹는다. 7월에 성장을 마친 애벌레는 잎을 말고 그 속에 고치를 짓고 번데기가 된다. 두 번째 성충은 7월 하순~8월 상순에 나타나고 애벌레는 8월 중순~9월에 많이 보인다. 시간이 지나 성장한 애벌레는 줄기로 이동하여 나무 껍질 틈에 고치를 짓고 번데기가 되어 겨울을 난다.</p> <p>애벌레는 햇가지 끝의 잎을 잎맥만 남기고 갉아 먹는데 사과나무와 거리에 심은 벚나무에 특히 피해가 많다.</p>