



사슴풍뎅이 / *Dicranocephalus adamsi* Pascoe, 1863

---

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	사슴풍뎡이속
과국명	꽃무지과
과명	Cetoniidae
일반특징	<p>몸은 넓적하다. 앞가슴은 공을 절반으로 나눈 모양이며, 가운데가 가장 넓다. 몸의 색깔은 붉은빛을 띤 갈색이다.</p> <p>수컷은 등의 대부분이 회색빛이 도는 흰색 가루로 덮여 있는데, 앞가슴등판은 가운데 앞쪽으로 길게 가루가 묻어 있지 않아서 그 부분이 마치 긴 자루 모양처럼 보인다. 암컷은 온몸에 가루가 없어 바탕색을 그대로 드러낸다.</p> <p>수컷의 머리방패는 양 옆이 길게 늘어나 있어서 긴 뿔 모양이며, 각각 가지가 나 있어 사슴뿔처럼 보인다.</p> <p>5월~6월에 나타나며 애벌레는 짙은 갈색의 비옥한 흙에서 자란다. 이른 봄에 다 자란 애벌레는 번데기 방을 만들고 그 속에서 번데기가 된 후 5월 경에 성충이 되어 짝 기를 한다.</p> <p>중국 서부, 동부 티벳, 베트남에 분포한다.</p>