

: 2025 11 8 3:46



사향제비나비 / Atrophaneura alcinous (Klug, 1836)

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	곤충
속국명	사향제비나비속
과국명	호랑나비과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Papilionidae
일반특징	몸에서 사향 냄새가 나며, 날개 길이가 41~55mm에 달하는 대형이다. 암컷은 날개에 무늬처럼 갈라져 있는 맥과 가장자리, 꼬리처럼 생긴 돌기를 제외하고는 어두운 회색이다. 수컷의 날개 윗면은 검은색이고 약간 광택이 나지만, 암컷은 누런빛을 띤 갈색으로 광택이 없다. 또 수컷의 뒷날개 윗면 가장자리에는 반달 무늬가 없거나 희미하지만, 암컷은 뚜렷하게 나타난다. 수컷은 채집 직후 사향 냄새가 난다. 다른 제비나비 무리들과는 달리 산꼭대기를 점유하거나 나비길을 만들지는 않는다. 암컷은 먹이 식물을 찾아 풀사이를 날아다니며 잎 뒷면에 1~6개정도의 알을 낳는다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다. 산 주변의 평지 또는 개울가의 풀이 많은 곳에 서식한다. 암수 모두 엉겅퀴, 쉬땅나무, 아카시아나무 등의 꽃에서 꿀을 먹거나 물가에 나와 물을 먹기도한다.